

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Фарингосепт®

Регистрационный номер: П N015365/01

Торговое название: Фарингосепт®

Международное непатентованное название: Амбазон

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона.

Таблетки для рассасывания со вкусом мяты.

Таблетки для рассасывания со вкусом корицы.

Таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона.

Таблетки для рассасывания со вкусом лесных ягод.

Состав

Каждая таблетка для рассасывания со вкусом лимона содержит:

Действующее вещество: амбазона моногидрат 10,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза 745,0 мг, лактозы моногидрат 150,0 мг, какао-бобов порошок 25,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор лимонный 10,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг.

Каждая таблетка для рассасывания со вкусом мяты содержит:

Действующее вещество: амбазона моногидрат 10,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 139,0 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор мяты перечной 12,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг.

Каждая таблетка для рассасывания со вкусом корицы содержит:

Действующее вещество: амбазона моногидрат 10,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 143,0 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор корицы 8,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг.

Каждая таблетка для рассасывания со вкусом мёда и лимона содержит:

Действующее вещество: амбазона моногидрат 10,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 135,0 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор лимонный 12,0 мг, ароматизатор медовый 4,0 мг, стеариновая кислота 10,0 мг.

Каждая таблетка для рассасывания со вкусом лесных ягод содержит:

Действующее вещество: амбазона моногидрат 10,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза 729,0 мг, лактозы моногидрат 148,5 мг, какао-бобов порошок 50,0 мг, повидон К-30 50,0 мг, ароматизатор смеси ягод 2,5 мг, стеариновая кислота 10,0 мг.

Описание:

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона:

Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «L» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Таблетки для рассасывания со вкусом мяты:

Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «M» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Таблетки для рассасывания со вкусом корицы:

Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «C» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона:

Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «H» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Таблетки для рассасывания со вкусом лесных ягод:

Круглые, плоскоцилиндрические, скошенные к краю таблетки, коричневого цвета с неповрежденными краями и гравировкой «F» на одной стороне. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.

Код АТХ: [R02AA01]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает бактериостатическим действием. Оказывает местное противомикробное действие. Активен в отношении ряда грамположительных микроорганизмов (*Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus viridans*, *Pneumococcus*), а также в отношении грибов рода *Candida*. На микрофлору кишечника не влияет.

Фармакокинетика

Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3-4 день приема препарата при дозе 0,03-0,05 г/сут.

Показания к применению

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: тонзиллит, гингивит, стоматит, фарингит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амбазону и другим компонентам препарата; непереносимость лактозы, фруктозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит лактазы; детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата.

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15-30 минут после еды). После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приема пищи.

Взрослым: по 4-5 таблеток (0,04-0,05 г) в сутки.

Детям: от 3 до 7 лет 3 таблетки (0,03 г) в сутки.

Курс лечения 3-4 дня.

Побочное действие

Аллергические реакции на компоненты препарата, кожная сыпь.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки амбазона неизвестны. Антидота нет. Возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. При применении чрезмерной дозы рекомендуется промыть желудок.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Препарат не рекомендуется применять пациентам с наследственной непереносимостью сахарозы и лактозы.

Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.

При сохранении симптомов или при появлении повышения температуры тела или головной боли следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона 10 мг:

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и темной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки.

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и бесцветной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки.

По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Таблетки для рассасывания со вкусом мяты 10 мг, таблетки для рассасывания со вкусом корицы 10 мг, таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона 10 мг, таблетки для рассасывания со вкусом лесных ягод 10 мг:

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и бесцветной прозрачной ПВХ-ПЭ-ПВДХ пленки.

По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Таблетки для рассасывания со вкусом лимона – 3 года.

Таблетки для рассасывания со вкусом мяты – 2 года.

Таблетки для рассасывания со вкусом корицы – 2 года.

Таблетки для рассасывания со вкусом мёда и лимона – 2 года.

Таблетки для рассасывания со вкусом лесных ягод – 2 года.

Препарат нельзя использовать позже указанной на упаковке даты.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.,

Сан Хауз, Плот № 201 Б/1, Вестерн Экспресс Хайвэй, Горегаон (Ист), Мумбаи – 400063,
Махараштра, Индия

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.,

Sun House, Plot № 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai – 400063,
Maharashtra, India.

Производитель

С. К. Терапия С.А., 400632, ул. Фабричии 124, Клуж-Напока, уезд Клуж, Румыния.

S.C. Terapia S.A., 400632, 124 Fabricii Street, Cluj-Napoca, Cluj County, Romania

Претензии потребителей направлять в представительство компании

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. по адресу:

129223, г. Москва, пр. Мира, дом. 119, стр. 537/2

Тел.: (495)234-56-11/15,

факс: (495)234-56-19.

